



Medication List

Please review this list carefully, and tell us if you are taking or have taken any of these medications.

Medication	Which is also known as...	And is usually used for...	In the last...	You should not donate because the medication may...
Orgaran	danaparoid	Anticoagulants or "blood thinners" (usually to prevent blood clots in the legs and lungs and to prevent strokes)	1 week	Affect the blood's ability to clot, which might cause excessive bruising or bleeding when you donate
Innohep	tinzaparin			
Fraxiparine	nadroparine			
Xarelto	rivaroxaban			
Fragmin	dalteparin			
Lovenox	enoxaparin			
Pradaxa	dabigatran			
Eliquis	apixaban			
Savaysa	edoxaban			
Coumadin Jantoven Warfilone	warfarin			
Heparin	heparin			
Arixtra	fondaparinux			
Cyclomen	danazol	Androgen	1 week	Harm patients who receive medications prepared from your plasma by causing birth defects in unborn babies
Toctino	alitretinoin	severe chronic hand eczema	1 month	
Absorica Accutane Amnesteem Claravis Clarus Myorisan Sotret Zenatane	isotretinoin	Severe acne	1 Month	
Propecia	finasteride	Baldness		
Proscar		Enlarged prostate gland		
Rinvoq		upadacitinib		



Avodart Jalyn	dutasteride	Enlarged prostate gland	6 months	Harm patients who receive medications prepared from your plasma by causing birth defects or the death of an unborn baby
Aubagio	teriflunomide	Relapsing multiple sclerosis	2 years	
Erivedge	vismodegib	Basal cell skin cancer		
Odomzo	sonidegib	Basal cell skin cancer		
Arava	leflunomide	Rheumatoid arthritis	Ever	
Depakote Depakote ER Convulex Eplim Stavzor	valproate valproic acid sodium valproate	Epilepsy Bipolar Disorder Migraine prevention		
Soriatane	acitretin	Severe psoriasis		
Tegison	etretinate	Severe psoriasis		
Thalomid	thalidomide	Multiple myeloma		
Truvada	emtricitabine/ tenofovir	HIV Prevention		
Descovy	emtricitabine/ tenofovir alafenamide	HIV Prevention		
Antiretroviral therapy (ART)		HIV Treatment	Ever	Antiretroviral therapy used in patients infected with HIV does not fully eliminate the virus from the body. As a result, the virus is still present but may be undetectable by current tests, increasing the risk of transmitting HIV
HepaGam B HyperHEP B S/D Nabi- HB	hepatitis B immune globulin	Exposure to hepatitis B	12 months	Not prevent you from contracting hepatitis B infection following a possible or known exposure
Growth hormone from human pituitary glands		Delayed growth in children	Ever	Harm patients who receive medications prepared from your plasma by increasing the risk of transmitting CJD or vCJD
Bovine or beef insulin		Diabetes		
Anti-D Immunization Program			Ever	Presence of irregular antibodies to red blood cells

<p>Any experimental or unlicensed vaccine or medication</p>	<p>Ever</p>	<p>Harm patients who receive medications prepared from your plasma. Medical evaluation needed.</p>
<p>If you are taking or have taken these medications you may not be eligible to donate PLASMA, whole blood or platelets</p>		

Please note: Donors **SHOULD NOT discontinue medications** prescribed or recommended by their physician in order to donate plasma.



Liste de médicaments

Veillez lire cette liste attentivement et préciser si vous prenez présentement l'un de ces médicaments ou si vous en avez déjà pris.

Médicament	Aussi connu sous le nom de ...	Est d'ordinaire utilisé pour...	Depuis...	Vous ne devriez pas faire de don puisque ce médicament peut...
Orgaran	danaparoïde	Anticoagulants ou agents qui amincissent le sang (d'ordinaire pour prévenir les caillots sanguins dans les jambes et les poumons et pour éviter les accidents cérébrovasculaires)	La dernière semaine	Affecter la coagulation du sang, ce qui peut entraîner des ecchymoses ou des saignements excessifs au moment de faire un don de sang
Innohep	tinzaparine			
Fraxiparine	nadroparine			
Xarelto	rivaroxaban			
Fragmin	dalteparine			
Lovenox	enoxaparine			
Pradaxa	dabigatran			
Eliquis	apixaban			
Savaysa	edoxaban			
Coumadin Jantoven Warfilone	warfarine			
Heparin	héparine			
Arixtra	fondaparinux			
Cyclomen	Danazol	Androgène	La dernière semaine	Nuire aux patients qui reçoivent des médicaments préparés à partir de votre plasma en causant des anomalies congénitales chez les fœtus
Toctino	alitretinoïne	Traitement de l'eczéma chronique grave des mains	Le dernier mois	
Absorica Accutane Amnesteem Claravis Clarus Myorisan Sotret Zenatane	isotretinoïne	Acné grave	Le dernier mois	
Propecia	finasteride	Calvitie		
Proscar		Hypertrophie de la prostate		
Rinvoq	upadacitinib	Polyarthrite rhumatoïde		



Avodart Jalyn	dutastéride	Hypertrophie de la prostate	Les 6 derniers mois	Nuire aux patients qui reçoivent des médicaments préparés à partir de votre plasma en causant des anomalies congénitales chez les fœtus
Aubagio	tériflunomide	sclérose en plaques cyclique	Les 2 dernières années	
Erivedge	vismodégib	Cancer de la peau à cellules basales		
Odomzo	Sonidegib	Cancer de la peau à cellules basales		
Arava	leflunomide	Polyarthrite rhumatoïde		
Depakote Depakote ER Convulex Eplim Stavzor	valproate acide valproïque valproate de sodium	Épilepsie Trouble bipolaire Prévention de la migraine	À n'importe quel moment	
Soriatane	Acitrétine	Psoriasis grave		
Tegison	Etretinate	Psoriasis grave		
Thalomid	thalidomide	Myélome multiple		
Truvada	emtricitabine/ tenofovir	Prévention du VIH		
Descovy	emtricitabine/ tenofovir alafenamide	Prévention du VIH	4 mois	Prolonger la période pendant laquelle une infection au VIH n'est pas encore décelable
Thérapie antirétrovirale (TAR)		Traitement contre le VIH	Déjà	La thérapie antirétrovirale utilisée chez les patients infectés par le VIH n'élimine pas complètement le virus de l'organisme. Par conséquent, le virus demeure présent mais celui-ci peut être impossible à détecter par les tests disponibles actuellement. Le risque de transmission du VIH est ainsi accru.
HepaGam B HyperHEP B S/D Nabi- HB	immunoglobuline anti-hépatitique B	Exposition à l'hépatite B	Les 12 derniers mois	Ne pas vous protéger contre l'hépatite B après une exposition possible ou connue

Hormone de croissance provenant des glandes pituitaires humaines	Retard de croissance chez les enfants	À n'importe quel moment	Nuire aux patients qui reçoivent des médicaments préparés à partir de votre plasma en augmentant le risque de transmission de la maladie de CJ ou de la vMCJ
Insuline bovine ou de bœuf	Diabète		
Programme de vaccination anti-D		à tout moment	Présence d'anticorps irréguliers dirigés contre les globules rouges
Tout vaccin ou médicament expérimental et non homologué		À n'importe quel moment	Nuire aux patients qui reçoivent des médicaments préparés à partir de votre plasma. Une évaluation médicale s'impose.
Si vous prenez ou avez déjà pris l'un de ces médicaments, il est possible que vous ne soyez pas admissible à donner du PLASMA, du sang total ou des plaquettes			

Nota : Les donneurs **NE DEVRAIENT PAS** cesser de prendre un médicament prescrit ou recommandé par leur médecin dans le but de donner du plasma.